GREENHAS
GROUP

ANTICIPA Y UNIFORMA LA DE LAS YEMAS

La cantidad y calidad de las horas frio que acumulan las plantas, son las responsables del correcto desarollo y brotacion de las yemas a flor, y en consecuencia, de la cantidad de frutos por plantas. Una óptima producción y rentabilidad económica están fuertemente conectadas a una vigorosa y abundante floración.

Por esta razón, sobre todo en esta época de cambios climáticos, la falta de horas de frio en almendro puede causar un retraso en la de las yemas y una irregularidad en su formación, con un consecuente mal cuaje y mala maduración que influyen negativamente sobre la producción final.

Para cumplir con esta exigencia, Greenhas Group ha desarrollado **SIBERIO**, una innovadora herramienta que interrumpe la dormancia de las yemas: **SIBERIO**, mezclado con su activador **SIBERIOn**, es un nutricional a base de nitrógeno enriquecido con calcio, hierro y zinc que activa los procesos metabólicos (carbohidratos y el metabolismo de la pared celular) para interrumpir la dormancia de las yemas.

El producto se trabaja en madera (cuando el almendro no tenga hojas) y actúa penetrando en el interior de la yema dormida transportando los elementos nutritivos que activan los procesos enzimáticos y crean la energía necesaria para que los tejidos meristemáticos broten y se desarrollen de forma homogénea y regular.

Polígono Industrial La Redonda Calle Paises Bajos 26, El Ejido Almería - Spain
Tel. +34.950580942 - **info@greenhasgroup.es** - **www.greenhasgroup.es**

SIBERIO permite una mejor homogenización de floración y cuajado que, en caso de variedad auto-fértiles de almendro, consiente de pilotar el momento de plena floración y de obtener una consistente rentabilidad: de hecho, cuanto mayor sea el número de yemas que florezcan a la vez, más fácil será optimizar y organizar los tratamientos nutricionales y fitosanitarios durante todo el ciclo del cultivo.

El producto se aplica 20 días antes de la floración porque es prioritario que el mayor número de yemas se abra; las ventajas principales de la aplicación de **SIBERIO** son uniformidad en la y homogeneidad de la maduración y uniformidad de tamaño porque la apertura homogénea de las yemas favorece una maduración uniforme en todo el frutal.

Prunus dulcis (var. Lauranne) loc. Las Cabezas de San Juan (Sevilla)

excelente floración obtenida con la tesis "8 l Siberio + 8 l Siberion" aplicada 20 días antes de la rotura yemas (BBCH 19)

Prunus dulcis (var. Lauranne) loc. Las Cabezas de San Juan (Sevilla)

consecuente aumento porcentual de cuajado con la misma tesis "8 l Siberio + 8 l Siberion" aplicada 20 días antes de la rotura yemas (BBCH 19)

CULTIVOS	**DOSIS** (partes leñosas)			**EJEMPLO DE APLICACIÓN**	**FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES**
	SIBERIO	**SIBERIOn**	**Volumen de agua***		
ALMENDRO	6 - 8 l/100 l	6 - 8 l/100 l	600 - 800 l/ha	6 l **Siberio** + 8 l **Siberion** + 86 l de agua	De 20 a 25 días antes de floración*, sobre la parte aérea

*De acuerdo con los cultivos y las condiciones climáticas