GREENHAS
GROUP

NOTA TÉCNICA
SOBRE FLORACIÓN KIWI

La fase fenológica de floración en **kiwi** es un período crucial en el ciclo de vida de la planta, que se caracteriza por una serie de cambios fisiológicos y morfológicos. Durante esta fase, la planta de **kiwi** produce y desarrolla flores en preparación para la polinización y la posterior producción de frutos.

El proceso de floración en **kiwi** está regulado por factores como temperatura, luz, humedad y sobre todo fertilización: de hecho, es una etapa crucial en el ciclo de vida de la planta que marca el comienzo de la producción de frutos y es esencial para garantizar una buena cosecha. Para cumplir con esta exigencia, **Greenhas Group** ha desarrollado una estrategia nutricional tanto por vía foliar como por vía radical que suporta el cultivo y lo predispone a una abundante floración y cuaje.

En aplicación foliar, por los primeros dos pases se recomienda el utilizo de **GREENSET**, un formulado orgánico líquido à base de aminoácidos vegetales procedentes de alga *Eckonia máxima* con zinc quelatado con EDTA, boro y molibdeno que induce la planta a una correcta y copiosa floración, en asociación con **CALFOMYTH**, fertilizante mineral liquido con fosforo, calcio y boro que suporta la planta en el proceso de división celular y aumenta la resistencia de la pared celular gracias a su contenido en calcio.

Polígono Industrial La Redonda Calle Paises Bajos 26, El Ejido Almería - Spain
Tel. +34.950580942 - **info@greenhasgroup.es** - **www.greenhasgroup.es**

El tercero pase foliar, fundamental para obtener una correcta elongación/ engrosamiento del peciolo y órganos florales homogéneos y agrandados, se realiza gracias a la acción combinada de **ALGAREN**, un bioestimulante natural líquido a base de 100% algas marinas *Ecklonia máxima* que estimula los procesos fisiológicos de la planta la predispone a un excelente cuaje, y **CALBORON**, un producto de incomparable solubilidad a base de calcio vehiculado por ácidos carboxílicos y boro que fortalece la consistencia de los tejidos vegetales, optimiza el cuajado y reduce la caída de flores y frutos.

Paralelamente en fertirriego, la estrategia de **Greenhas Group** se actúa con dos tratamientos en las primeras dos semanas.

La primera semana es importante suministrar la combinación de **FISIOCAL**, calcio liquido potenciado con activadores naturales que aumenta significativamente la asimilación y el transporte de calcio en forma acrópeta y promueve la translocación de la parte aérea a los frutos, con Magnesiogreen attivato, un fertilizante mineral en polvo hidrosoluble de alta solubilidad y pureza que contiene Magnesio, Azufre y microelementos sinérgicos.

En la segunda semana, la unión de **NUTRIGREEN LEVO**, fertilizante orgánico líquido que contiene aminoácidos levógiros obtenidos mediante hidrólisis enzimática que suporta y ayuda la planta a contrastar cualquier tipo de estrés abiótico, y **KELAGREEN MIX**, multicorrector mineral en polvo e hidrosoluble que proporciona micronutrientes esenciales para las principales reacciones bioquímicas de las plantas, completa el ciclo de fertilización dedicada al obteniendo de la mejor floración/cuajado en **kiwi**.

PRE-FLORACIÓN Y FLORACIÓN

CULTIVO	PRODUCTOS			FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES
KIWI	**GREENSET** 1,5 - 2 l/ha	+	**CALFOMYTH** 3 - 5 l/ha	1° pase 10% (en yema hinchada) 2° pase 40% apertura de flores
	ALGAREN 2,5 l/ha	+	**CALBORON** 5 kg/ha	3° pase 100% apertura de flores previo a cuaje

FLORACIÓN

CULTIVO	PRODUCTOS			FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES
KIWI	**FISIOCAL** 10 l/ha	+	**MAGNESIOGREEN ATTIVATO** 10 kg/ha	1ª semana
	NUTRIGREEN LEVO 10 l/ha	+	**KELAGREEN MIX** 5 kg/ha	2ª semana