MAGIC P

FAVORECE EL DESARROLLO VEGETATIVO Y RADICULAR - EFECTO ESTARTER

FERTILIZANTE UE

conforme al Reglamento UE 2019/1009

MAGIC P es un abono mineral fluido a base de fósforo activado con magnesio que garantiza la máxima disponibilidad de ambos nutrientes también a bajas temperaturas y durante las fases más críticas del cultivo.

La fórmula especial favorece la rápida asimilación del fósforo y es ideal para promover el desarrollo radicular; además, el contenido de magnesio mejora y aumenta la fotosíntesis, mientras el zinc (en forma quelatada) es un refuerzo vegetativo para las plantas y ayuda la asimilación del magnesio mismo.

MAGIC P puede aplicarse tanto por vía foliar como en fertirrigación después de la siembra, en post-trasplante y durante la floración también en condiciones de poca luz y baja temperatura.

MAGIC P tiene también una acción acidificante, útil para mejorar la calidad de los tratamientos cuando se mezcla con otros agroquímicos.

RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p (equivalente % p/v a 20°C)	
Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en agua	**30**% p/p (42% p/v)
Óxido de magnesio (**MgO**) soluble en agua	**7**% p/p (9,8% p/v)
Cobre (**Cu**), quelado por EDTA, soluble en agua	**0,01**% p/p (0,014% p/v)
Zinc (**Zn**) quelado por EDTA soluble en agua	**0,02**% p/p (0,028% p/v)

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,40 g/ml
pH (sol. ac. 1% p/p): 3,0 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (1 g/l a 20°C): 450 µS/cm

ENVASES DISPONIBLES
5 - 15 - 850 l

PORQUE ELEGIR MAGIC P

1. Efecto estarter debido a la presencia de fósforo
2. Alta disponibilidad de fósforo y magnesio, también a bajas temperaturas
3. Elevada absorción foliar y radicular

FORMA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	DOSIS		FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES
	FOLIAR	FERTIRRIEGO	
FRUTALES, VID, CÍTRICOS, OLIVO	3 - 5 l/ha	20 - 25 l/ha	Desde inicio vegetación hasta floración
HORTALIZAS EN INVERNADERO	1,5 - 2 l/ha	10 l/ha	Post-trasplante; pre-floración
HORTALIZAS EN CAMPO ABIERTO Y CULTIVOS INDUSTRIALES	2,5 - 3,5 l/ha	20 - 25 l/ha	
VIVEROS	1 - 2 l/ha	8 - 10 l/ha	Post-trasplante
FLORESE Y ORNAMENTALES	1,5 - 2 l/ha	10 - 20 l/ha	Post-trasplante; pre-floración
Mojar semillas, bulbos y estacas en una solución al 0,2 - 0,4% antes de la siembra.			

De conformidad con el art. 48 del Reglamento CE 1272/2008 (CLP) antes de concluir el contrato de compra es necesario leer los peligros asociados al producto.