MAGNESIOGREEN ATTIVATO

PREVIENE Y CORRIGE LAS CARENCIAS DE MAGNESIO Y MICRONUTRIENTES

FERTILIZANTE UE

conforme al Reglamento UE 2019/1009

Producto utilizable en Agricultura Ecológica según los Reglamentos UE n° 2018/848 y 2021/1165 -Control ECOCERT SAS

MAGNESIOGREEN ATTIVATO es un fertilizante mineral en polvo hidrosoluble de alta solubilidad y pureza que contiene Magnesio, Azufre y microelementos sinérgicos. El Magnesio es fundamental para la formación de la clorofila, la asimilación del fósforo, así como para la síntesis de azúcares y pectinas. Los microelementos presentes en forma quelatada previenen las carencias nutricionales y favorecen la absorción del magnesio.

RIQUEZAS GARANTIZADAS:	
Óxido de Magnesio (**MgO**) soluble en agua	**15,5**% p/p
Trióxido de azufre (SO_3) soluble en agua	**31**% p/p
Boro (**B**) soluble en agua	**0,05**% p/p
Cobre (**Cu**) quelado por EDTA soluble en agua	**0,1**% p/p
Manganeso (**Mn**) quelado por EDTA soluble en agua	**0,1**% p/p
Zinc (**Zn**) quelado por EDTA soluble en agua	**0,15**% p/p

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Solubilidad en agua a 20°C (g/l): 470 g/l
pH (sol. ac. 1% p/p): 6,5 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (1 g/l a 20°C): 845 µS/cm

ENVASES DISPONIBLES
5 - 25 kg

POR QUÉ ELEGIR MAGNESIOGREEN ATTIVATO

1. Aumenta la eficiencia fotosintética y previene las fisiopatologías debidas a las deficiencias de magnesio
2. Aporta azufre y microelementos quelados
3. Alta solubilidad incluso en aguas con alto contenido en carbonatos y bicarbonatos

FORMA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	DOSIS		FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES
	FOLIAR	FERTIRRIEGO	
FRUTALES, VID, CÍTRICOS, OLIVO	2,5 - 4,5 kg/ha	25 - 75 kg/ha	Antes y después de la floración
HORTALIZAS EN INVERNADERO	2 - 3 kg/ha	25 - 50 kg/ha	Durante el crecimiento vegetativo y el engorde frutos
HORTALIZAS EN CAMPO ABIERTO Y CULTIVOS INDUSTRIALES	2 - 4 kg/ha	25 - 75 kg/ha	
VIVEROS	1 - 1,5 kg/ha	10 kg/ha	Fase inicial de crecimiento
FLORES Y ORNAMENTALES	1,5 - 2 kg/ha	25 kg/ha	Crecimiento vegetativo
CULTIVOS SIN SUELO	se puede utilizar durante la preparación de la solución madre		