ENVASES DISPONIBLES
15 l

SIBERIO

HPP HIGH PERFORMANCE PROCESS

ANTICIPA Y UNIFORMA LA BROTACIÓN DE LAS YEMAS

BIOESTIMULANTE PARA FAVORECER LA BROTACIÓN

conforme al Reglamento UE 2019/1009

SIBERIO es un bioestimulante desarrolado para favorecer la brotación.

El producto mejora el arranque vegetativo y la uniformidad de brotación, lo que se traduce en beneficios apreciables sobre el equilibrio de la floración y del cuajado, garantizando así el mejor rendimiento.

SIBERIO, gracias a su especial formulación, penetra en el interior de las yemas latentes nutriéndolas y favoreciendo los procesos enzimáticos y metabólicos de la planta.

SIBERIO uniformiza la brotación de las yemas en primavera, es más homogéneo el inicio del crecimiento vegetativo y la sucesiva floración, aumentando cuantitativa y cualitativamente la producción de los cultivos en las áreas geográficas donde, debido a que los inviernos son suaves, no se alcanza la suma de horas frío necesarias.

PORQUE ELEGIR SIBERIO

1 Uniforma brotación, floración y cuaje

2 Anticipa el desarrollo de las plantas que no han acumulado suficientes horas frío

3 Efecto nutricional que favorece el desarrollo de nuevas ramas



FASE 1

SIBERIO aplicado sin hojas, es capaz de penetrar rápidamente al interior de la yema dormida transportando los elementos nutritivos.



FASE 2

Los nutrientes, una vez que han penetrado en la yema, activan los procesos enzimáticos y crean la energía necesaría para que los tejidos meristemáticos inicien el crecimiento.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

	SIBERIO
Densidad (a 20°C)	1,24 g/ml
pH (sol. ac. 1% p/p)	7,0
C.E. (1 g/l a 20°C)	550 µs/cm

ADVERTENCIAS:

- No utilizar en plantas jóvenes de menos de 3 años.
- Puede causar fitotoxicidad en plantas débiles o poco lignificadas.
- Cualquier tratamiento con aceites minerales debe realizarse al menos una semana después de la aplicación de SIBERIO.
- No distribuir durante la fase vegetativa del cultivo.
- Evitar los efectos de deriva sobre los cultivos vecinos, especialmente en el caso de plantas de hoja perenne (p.ej. cítricos, olivo).
- Respetar estrictamente tanto las indicaciones del cultivo como las de la etiqueta.
- No utilizar en mezcla con productos distintos de SIBERIOn.
- Agitar los envases antes de su uso para homogeneizar el producto contenido.
- En caso de presencia de varias variedades en la misma parcela, seguir escrupulosamente las indicaciones sobre épocas de aplicación antes de la apertura de yemas, refiriéndose a cada una de ellas como en la tabla anterior, para evitar efectos de fitotoxicidad y obtener la mejor eficacia.
- En variedades nuevas, realizar una prueba preliminar en pocas plantas antes de proceder a aplicaciones extensivas.
- Siga estrictamente las instrucciones de la etiqueta para los tipos de cultivo y los pasos de aplicación. La inobservancia puede conducir a la pérdida de eficacia de SIBERIO fitotoxicidad y reducción de los rendimientos.

De conformidad con el art. 48 del Reglamento CE 1272/2008 (CLP) antes de concluir el contrato de compra es necesario leer los peligros asociados al producto.

GREENHAS GROUP

SIBERIO + SIBERIOn

SIBERIO debe utilizarse junto con su activador **SIBERIOn**

FORMA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	DOSIS POR APLICACIÓN*		EJEMPLO DE APLICACIÓN	FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES
	SIBERIO (l/hl)	SIBERIOn (l/hl)		
UVA DE MESA	6 - 8	16 - 20	6 l Siberio+16 l Siberion +78 l agua	
KIWI	6 - 8	16 - 20	6 l Siberio+16 l Siberion +78 l agua	
CEREZA	6 - 8	8	6 l Siberio+8 l Siberion +86 l agua	Entre 60 - 45 días antes de brotación *, sobre la parte aérea
ALBARICOQUE	7 - 8	7,5	6 l Siberio+8 l Siberion +86 l agua	
CIRUELO	7 - 8	7,5	6 l Siberio+8 l Siberion +86 l agua	
ALMENDRO	5 - 6	6 - 8	6 l Siberio+8 l Siberion +86 l agua	Entre 25 - 20 días antes de floración *, sobre la parte aérea
FRAMBUESA	3,5	9	3,5 l Siberio+9 l Siberion +87,5 l agua	Tratar solo inmediatamente después de la poda/caída de todas las hojas, estando todas las yemas lignificadas*
MANZANO	5 - 6	5 - 6	5 l Siberio+5 l Siberion +90 l agua	Entre 60 - 45 días antes de brotación *, sobre la parte aérea

* De acuerdo con los cultivos y las condiciones climáticas
Utilizar un volumen adecuado de agua para garantizar la correcta humectación de las yemas

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA

ENSAYO EN UVA DE MESA

Aplicación en uva de mesa (var. "Red Globe") para evaluar el aumento de la brotación de las yemas (Fez, Marruecos - 2018)

SIBERIO

SIBERIO 6%
45 días antes de la brotación

TESTIGO