EMBALAGENS DISPONÍVEIS
1 - 5 - 15 l

SOLVERO

UNIFORMIZA E ANTECIPA A COLORAÇÃO DOS FRUTOS

FERTILIZANTE UE

em conformidade com o Regulamento UE 2019/1009

Produto adequado para uso em agricultura orgânica em conformidade com os regolamentos EU 2018/848 e 2021/1165 e regulamento NOP
Controlo Ecocert SAS

SOLVERO é um adubo orgânico líquido de origem vegetal ideado para uniformizar e antecipar a coloração dos frutos. A ação específica sobre o metabolismo secundário da planta permite melhorar a componente estética dos frutos, sem alterar ou forçar o processo natural de maturação.

SOLVERO traz, portanto, vantagens económicas claras, especialmente porque as alterações climáticas e o aquecimento global tendem a favorecer o amadurecimento dos frutos, mas não a sua cor.

SOLVERO também melhora as caraterísticas organoléticas dos frutos e tem um efeito muito positivo na sua conservação pós-colheita.

MOTIVOS PARA ESCOLHER SOLVERO

1 Coloração uniforme e precoce dos frutos

2 Melhoria da vida pós-colheita das frutas

3 100% de origem vegetal

TEORES GARANTIDOS: % p/p (equivalente % p/v a 20°C)	
Azoto (**N**) total	**3,7**% p/p (4,4% p/v)
Azoto (N_{org}) orgânico de origem vegetal	3% p/p (3,6% p/v)
Azoto (N) amoniacal	0,7% p/p (0,8% p/v)
Oxido de potássio (K_2O) total	2% p/p (2,4% p/v)
Carbono (C_{org}) orgánico	16% p/p (19,2% p/v)
Matéria seca	50% p/p
C_{org} / N_{tot}	4,3

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Densidade (20°C): 1,20 g/ml
pH (1% p/p sol. aq.): 6,0 ± 0,5 u. pH
Condutividade elétrica (1 g/l a 20°C): 250 µS/cm

MODO DE APLICAÇÃO

CULTURAS	DOSES FOLIAR	FASE DE APLICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES
CULTURAS	3 - 5 l/ha*	Desde o final do engrossamento até à toda fase de coloração (pelo menos 2 aplicações em acordo com a precocidade da variedade)
UVA DE MESA Y UVA DE VINHO	3 - 5 l/ha*	Desde o final do engrossamento até à toda fase de coloração (pelo menos 2 aplicações em acordo com a precocidade da variedade)
MORANGOS E PEQUENOS FRUTOS	3 - 5 l/ha*	Ao princípio e durante toda a fase de coloração (pelo menos 2 aplicações)
HORTÍCOLAS (tomate, pimento, beringela)	2 - 3 l/ha*	Ao princípio da fase de coloração de cada ramalhete

* A dose máxima de cada cultura é aconselhada para alargar a vida pós-colheita

EVIDÊNCIAS

SOLVERO: EFEITO NA COLORAÇÃO DOS FRUTOS

Ensaio em morango (var. *Inspire*) – Metaponto (Matera) – Itália

CONTROLO

SOLVERO
3 l/ha

SOLVERO: AUMENTO DO TEMPO DE CONSERVAÇÃO DOS FRUTOS

Ensaio em nectarina (var. *Big Top*) – Cesena (Forlì Cesena) – Itália

% frutos comercializáveis pós-conservação*



(* 7 dias a 2°C + 5 dias a 18 - 20°C)

test SNK, p = 0,15