ENVASES DISPONIBLES
5 - 15 l

SOLVERO

UNIFORMA Y ANTICIPA LA COLORACIÓN DE LOS FRUTOS

FERTILIZANTE UE

conforme al Reglamento UE 2019/1009

Producto utilizable en Agricultura Ecológica según los Reglamentos UE n° 2018/848 y 2021/1165 y el Reglamento NOP
Control ECOCERT SAS

SOLVERO es un fertilizante orgánico líquido de origen vegetal, estudiado para uniformar y anticipar la coloración de los frutos. La acción especifica sobre el metabolismo secundario de la planta permite de mejorar el componente estético de los frutos, sin alterar ni forzar el proceso natural de maduración.

SOLVERO aporta, por tanto, claras ventajas económicas, sobre todo porque los cambios climáticos y el calentamiento global tienden a favorecer la maduración de los frutos pero no su color. **SOLVERO**, además mejora las características organolépticas de las frutas y tiene efectos muy positivos en su vida útil.

POR QUÉ ELEGIR SOLVERO

1 Coloración uniforme y anticipada de la fruta

2 Mejor vida útil de la fruta

3 100% de origen vegetale

RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p (equivalente % p/v a 20°C)	
Nitrógeno (**N**) total	3,7% p/p (4,4% p/v)
Nitrógeno (N_{org}) orgánico de origen vegetal	3% p/p (3,6% p/v)
Nitrógeno (N) amoniacal	0,7% p/p (0,8% p/v)
Óxido de potasio (K_2O) total	2% p/p (2,4% p/v)
Carbono (**Corg**) orgánico	16% p/p (19,2% p/v)
Materia secca	50%
C_{org} / N_{tot}	4,3

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Densidad (20°C): 1,20 g/ml
pH (sol. ac. 1% p/p): 6,0 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (1 g/l a 20°C): 250 µS/cm

FORMA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	DOSIS FOLIAR	FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES
FRUTALES	3 - 5 l/ha*	Desde el final del engorde hasta toda la fase de coloración (por lo menos 2 aplicaciones de acuerdo con la precocidad de la variedad)
UVA DE MESA Y UVA DE VINO	3 - 5 l/ha*	Desde el final del engorde hasta toda la fase de coloración (por lo menos 2 aplicaciones de acuerdo con la precocidad de la variedad)
FRESA Y BERRIES	3 - 5 l/ha*	Al principio y durante toda la fase de coloración (por lo menos 2 aplicaciones)
HORTÍCOLAS (tomate, pimiento, berenjena)	2 - 3 l/ha*	Al principio de la coloración de cada ramillete

*La dosis máxima de cada cultivo es aconsejada para alargar la vida postcosecha

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA

SOLVERO: EFECTO SOBRE LA COLORACIÓN DE LA FRUTA

Ensayo en fresa (var. "Inspire") - Metaponto (MT) - Italia

PLANTA NO TRATADA

SOLVERO

(Dosis: 3 l/ha)

SOLVERO: AUMENTO DE LA VIDA ÚTIL DE LAS FRUTAS

Ensayo en nectarina (var. "Big Top") - Cesena (FC) - Italia

% frutas comercializables post-conservación*



(*7 días a 2°C + 5 días a 18 - 20°C)

SNK's test, p=0,15